

Ffactorau ynghlwm wrth ordewdra neu fod dros bwysau yn ystod plentyndod mewn plant dan 5 oed Mai 2024

Jessica Williams, Charlotte Bowles, Antonia Needham-Taylor, David Jarrom, Elizabeth Gillen, Juliet Hounscome, Jacob Davies, Rhiannon Tudor Edwards, Elizabeth Doe, Iphieroho Oneyibo, Nathan Davies, Alison Cooper, Adrian Edwards, Ruth Lewis

Cefndir

Mae dros chwarter plant Cymru rhwng 4 a 5 oed yn ordew neu dros eu pwysau.

Gall bod yn ordew neu dros bwysau yn ystod plentyndod cynnar gynyddu'r risg o broblemau iechyd yn ystod plentyndod neu lencyndod, yn ogystal â bod dros bwysau neu'n ordew fel oedolyn.



Mae llawer o adolygiadau o '**ffactorau cysylltiedig**' (hynny yw, achosion posibl o) ordewdra neu fod dros bwysau yn ystod plentyndod eisoes yn bodoli, ond mae'r rhain yn archwilio plentyndod ar draws ystod o oedrannau.

Does dim adolygiadau cyfoes yn canolbwyntio'n benodol ar y ffactorau hyn lle cafodd y ffactor a'i effaith ar statws pwysau ei astudio mewn plant dan 5 oed.



Gall canfyddiadau'r adolygiad hwn amrywio o'r rhai sy'n cynnwys ystod oedran ehangach.

Gofynnwyd am y gwaith hwn gan dîm **Iechyd y Cyhoedd ac Anghydraddoldebau Llywodraeth Cymru** i helpu i lywio strategaeth a chynlluniau cyflawni 'Pwysau Iach, Cymru Iach'.

Sail Dystiolaeth

Roedd yr adolygiad yn archwilio

- 30 o **adolygiadau systematig**
- Roedd 28 o'r adolygiadau systematig hyn yn cynnwys astudiaethau a gafodd eu cynnal mewn gwledydd lle mae'r canfyddiadau'n debygol o fod yn gyffredinol drosglwyddadwy i'r DU
- gan gynnwys adolygiadau a gyhoeddwyd hyd at Rhagfyr 2023

Adolygiad gwyddonol trylwyr a manwl o lenyddiaeth bresennol ar bwnc penodol



Canfyddiadau Allweddol

Nodwyd ystod helaeth o ffactorau

- (1) **biolegol,**
- (2) **seicolegol,**
- (3) **amgylcheddol, a**
- (4) **chymdeithasol**

fel rhai sy'n gysylltiedig â gordewdra neu fod dros bwysau yn ystod plentyndod.

Beth yw dystiolaeth sicrwydd uchel?
Dyma lle mae'r tîm adolygu yn hyderus bod y dystiolaeth ysgrifenedig yn agos at realiti.

Roedd y rhan fwyaf o'r dystiolaeth sicrwydd uchel yn gysylltiedig â bod **dros bwysau**. Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth sicrwydd uchel ar ffactorau ynghylch **gordewdra** yn ystod plentyndod **yn benodol**.

Mae angen rhagor o adolygiadau dystiolaeth targedig i archwilio hyn.

Mae **tystiolaeth sicrwydd uchel** yn cefnogi:



Helpu **menywod dros bwysau gollu pwysau os ydyn nhw'n ceisio dod i ddisgwyl, neu'n ystyried dod i ddisgwyl.**



Helpu i **leihau cynnydd cyflym mewn pwysau yn ystod 12 mis cyntaf bywyd.**



Cynnig **cyfleoedd i blant mamau sy'n gweithio gael mynediad i fwydydd iach a gweithgarwch corfforol**, yn enwedig os yw'r mamau'n gweithio oriau hir.

Mae **tystiolaeth sicrwydd cymedrig** yn cefnogi:



Hyrwyddo **bwydo ar y fron.**



Hyrwyddo **babis yn arwain wrth fwyta.**



Monitro twf yn ystod y 2 flynedd gyntaf, yn enwedig ar gyfer babanod sy'n tyfu yn gyflym am gyfnod.



Lleihau nifer y diodydd â siwgr sy'n cael eu hyfed.



Lleihau cynnydd cyflym mewn pwysau [diangen] yn ystod 13 mis cyntaf bywyd baban.



Addysgu a **chefnogi'r teulu ehangach** i gynnig opsiynau bwyd iachach a chyfleoedd chwarae.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddarllen yr **adroddiad llawn**, cliciwch yma: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.10.14.24314839v1>

I gael gweld manylion am **sail dystiolaeth yr adolygiad**, cliciwch yma: [Deilliannau](#)