

Ffactorau ynghlwm wrth fod dros bwysau a gordewdra mewn plant o dan 5 mlwydd oed: Adolygiad cyflym Mai 2024

Jessica Williams, Charlotte Bowles, Antonia Needham-Taylor, David Jarrom, Elizabeth Gillen, Juliet Hounscome, Jacob Davies, Rhiannon Tudor Edwards, Elizabeth Doe, Iphieroho Oneyibo, Nathan Davies, Alison Cooper, Adrian Edwards, Ruth Lewis

Cefndir

Mae dros chwarter plant Cymru rhwng 4 a 5 mlwydd oed yn byw gyda gorbwysau neu ordewdra.

Gall byw gyda gorbwysau neu ordewdra yn ystod plentynod cynnar gynyddu'r risg o broblemau iechyd yn ystod plentynod neu lencyndod, yn ogystal â bod dros bwysau neu'n ordew fel oedolyn.



Mae llawer o adolygiadau o '**ffactorau cysylltiedig**' (hynny yw, achosion posibl) o fyw gyda gordewdra neu orbwysau yn ystod plentynod eisoes yn bodoli, ond mae'r rhain yn archwilio plentynod ar draws ystod o oedrannau

Does dim adolygiadau cyfoes yn canolbwyntio'n benodol ar y ffactorau hyn lle cafodd y ffactor a'i effaith ar statws pwysau ei astudio mewn plant dan 5 oed.



Gall canfyddiadau'r adolygiad hwn amrywio o'r rhai sy'n cynnwys ystod oedran ehangach.

Gofynnwyd am y gwaith hwn gan dîm **Iechyd y Cyhoedd ac Anghydraddoldebau Llywodraeth Cymru** i helpu i lywio strategaeth a chynlluniau cyflawni 'Pwysau Iach, Cymru Iach'.

Sail Dystiolaeth

Roedd yr adolygiad yn archwilio

- 30 o **adolygiadau systematig**
- Roedd 28 o'r adolygiadau systematig hyn yn cynnwys astudiaethau a gafodd eu cynnal mewn gwledydd lle mae'r canfyddiadau'n debygol o fod yn gyffredinol drosglwyddadwy i'r DU
- gan gynnwys adolygiadau a gyhoeddwyd hyd at Rhagfyr 2023

Adolygiad gwyddonol trylwyr a manwl o lenyddiaeth bresennol ar bwnc penodol



Canfyddiadau Allweddol

Nodwyd ystod helaeth o ffactorau

- (1) **biolegol,**
- (2) **seicolegol,**
- (3) **amgylcheddol, a**
- (4) **chymdeithasol**

fel rhai sy'n gysylltiedig â byw gyda gorbwysau neu ordewdra yn ystod plentyndod.

Beth yw dystiolaeth sicrwydd uchel?
Dyma lle mae'r tîm adolygu yn hyderus bod y dystiolaeth ysgrifenedig yn agos at realiti.

Roedd y rhan fwyaf o'r dystiolaeth sicrwydd uchel yn gysylltiedig â byw gyda **gorbwysau**. Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth sicrwydd uchel ar ffactorau ynghylch byw gyda **ordewdra** yn ystod plentyndod, **yn benodol**.

Mae angen rhagor o adolygiadau dystiolaeth targedig i archwilio hyn.

Mae **tystiolaeth sicrwydd uchel** yn cefnogi:



Helpu merched sy'n byw gyda gorbwysau i golli pwysau os ydyn nhw'n ceisio dod i ddisgwyl, neu'n ystyried dod i ddisgwyl



Helpu i leihau cynnydd cyflym mewn pwysau yn ystod 12 mis cyntaf bywyd.



Cynnig cyfleoedd i blant mamau sy'n gweithio gael mynediad i fwydydd iach a gweithgarwch corfforol, yn enwedig os yw'r mamau'n gweithio oriau hir.

Mae **tystiolaeth sicrwydd cymedrig** yn cefnogi:



Hyrwyddo **bwydo ar y fron**.



Hyrwyddo **babis yn arwain wrth fwyta**.



Monitro twf yn ystod y 2 flynedd gyntaf, yn enwedig ar gyfer babanod sy'n tyfu yn gyflym am gyfnod.



Lleihau nifer y diodydd â siwgr sy'n cael eu hyfed.



Lleihau cynnydd cyflym mewn pwysau [diangen] yn ystod 13 mis cyntaf bywyd baban.



Addysgu a **chefnogi'r teulu ehangach** i gynnig opsiynau bwyd iachach a chyfleoedd chwarae.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddarllen yr **adroddiad llawn**, cliciwch yma: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.10.14.24314839v2>

I gael gweld manylion am **sail dystiolaeth yr adolygiad**, cliciwch yma: [Deilliannau](#)